

尿素呼気検査のご案内

尿素呼気検査をする前に下記ご確認お願い致します。

【2週間前より控えていただくこと】

▼抗生物質

Ampicillin・Amoxicillin・Bacampicillin・Cloxacillin・Dicloxacillin・Clarithromycin(Klacid)・
Cefdinir(Omnicef)・Cephalexin(Ibilex)・Chloramphenicol・Cotrimoxazole(Bactrim)・
Clindamycin(DalacinC)・Metronidazole(Flagyl)・Norfloxacin(Lexinor)・Roxithromycin

▼胃薬

Ulsanic(Sucrafate)

▼胃酸を抑える薬

Esomeprazole(Nexium)・Lansoprazole(Prevacid)・Omeprazole(Losec)・Pantoprazole(Controloc)
・Rabeprazole(Pariet)

▼ピロリ菌除菌のための薬

【4時間前より控えていただくこと】

お食事・水・お酒・たばこ・さとうきび・パイナップル

【注意事項】

- ・上記控えていただけなかった場合、検査を中止するもしくは正しい検査結果が得られない場合がございますので、予めご了承くださいませ。
- ・検査結果につきましては、メールにてご連絡させていただきます。直接医師から結果説明を希望される場合には当日スタッフまでお申し付けくださいませ。

【お問い合わせ】

DYM インターナショナルクリニック (DYM International Clinic)

▼電話番号(Phone Number)

TEL : +66(0)2-107-1039